## AVERTISSEMENTS

DLP 30-8-72 415150

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

AGRICOLES

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

ABONNEMENT ANNUEL

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE SI-DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

25 F

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-s-BOIS - 287 76-71

28 AOUT 1972.

BULLETIN n° 143 Supplément 1

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIERES

Bien que les températures aient été généralement déficitaires, les conditions climatiques n'ont pas été totalement défavorables à son évolution. Les piégeages et les élevages n'ont donné que de très faibles résultats. Le vol est donc peu important. Toutefois, en raison de la longévité du papillon, quieques pontes restent possibles, sauf en zones froides.

ACARIENS - Infestations brutales et importantes localement.

PSYLLES - Nombreux psylles dans certaines cultures.

TAVELURES - Des taches existantes peuvent créer des foyers graves.

Un traitement mixte pourra lutter contre les ravageurs précédents. Le méthylthiophanate actif contre tavelures et maladies de conservation doit être ajouté à la Note 143.

TORDEUSE DE LA PELURE - Les traitements contre Capua doivent être continués jusqu'au 20 septembre.

CARPOCAPSE DES PRUNES - Les sorties importantes se sont produites entre le 15 et le 20 août. La fin du vol devrait avoir lieu ces jours-ci.

GRANDES CULTURES

MILDIOU DE LA POMME DE TERRE - Le défanage des derniers champs attaqués doit être réalisé, l'infestation étant généralisée.

DESINFECTION DES SEMENCES DU COLZA - Les semences sont souvent traitées par le vendeur. Les fongicides utilisés sont à base de : Silicate de Méthoxyéthylmercure, Thirame (T M T D), Oxyquinoléate de cuivre, Dichlone, Captafol. L'insecticide est du Lindane (45 g. M. A./ Kg de semences). Ajouter une cuillerée à café d'huile végétale par kg de semences, pour assurer une bonne adhésivité.

CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE - Quelques foyers ont été détectés (Sud Seine-et-Marne). L'extension de la maladie est stoppée. La jaunisse est présente dans beaucoup de pièces.

CULTURES LEGUMIERES

MOUCHE DU CHOU - Après des sorties importantes, le vol est arrêté.

TEIGNE DU POIREAU - Le vol se poursuit, régulier.

ALTERNARIA DE LA TOMATE - Accentuation des dégâts. Voir liste des produits, également actifs contre le Mildiou dans la Note 143.

VIGNE

MILDIOU ET VERS DE LA GRAPPE - Les traitements doivent être continués.

L'Ingénieur et le Technicien chargés des Avertissements Agricoles,

Le Chef de la Circonscription de la Région Parisienne,

H. SIMON et R. MERLING.

R. SARRAZIN. 7288

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX.